



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1501 от « 22 » мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Инвиво», ОГРН 1082323000495

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл *Bacillus subtilis*, штамм 63-Z)

(наименование пестицида или агрохимиката)

242-01-1501-1

получил государственную регистрацию за №

21

мая

2027

на срок по « »

г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

(подпись)

М. П.

№ 001701

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2 - 5 л/га	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая - через 2 недели после появления всходов и далее при необходимости через 14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	(2)
1 - 2 л/т	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)
20 мл/кг	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов. Расход рабочей жидкости - 1 - 1,5 л/кг	
3-5 л/га	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву перед посевом. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости - 800 л/га	(2)
20 мл/кг	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Предпосевное замачивание семян в 2 % рабочем растворе в течение 1 - 2 часов. Расход рабочей жидкости - 1,0 - 1,5 л/кг	(1)
3 - 5 л/га			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	(2)
20 мл/кг	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость, альтернариоз	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1 - 2 часов. Расход рабочей жидкости - 1,0- ,5 л/кг	(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Баксис, Ж (титр не менее 10⁹ КОЕ/мл *Bacillus subtilis*, штамм 63-Z)
от 22 мая 2017 г. № 1501

1	2	3	4	5
3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	(1)
			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	(2)
20 мл/кг	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевин- ны стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1 -2 часов Расход рабочей жидкости 1,0 - 1,5 л/кг	(1)
3 - 8 л/га			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости 800 - 1000 л/га	(2)
4-7 л/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания - после цветения с интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости 1000 - 1500 л/га	(4)
4-8 л/га	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль, церкоспороз	Опрыскивание лозы в фазу начала движения сока и набухания почек. Повторная обработка - в фазу 2-4 листьев, перед и после цветения. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	(2)
3-8 л/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 18-20 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	(2-4)
3 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е - по всходам, последующие с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости - 200- 250 л/га	(4)
2-5 л/га			Обработка почвы перед посевом и/или через 15 дней после посева, повторная обработка - через 1-1,5 месяца. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	(2)

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений И.А. Чекмарев



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл *Bacillus subtilis*, штамм 63-Z)
от 22 мая 2017 г. № 1502

1	2	3	4	5
1 л/т	Пшеница яровая, ячмень яровой	Гельминтоспориоз ная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистость листьев	Предпосевная обработка семян за- 3- 12 дней до посева или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)
1-1,5 л/га		Мучнистая роса, темно-бурая пят- нистость, сетчатая пятнистость, рин- хоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	(1-2)
1 л/т	Пшеница озимая, ячмень озимый	Гельминтоспориоз ная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистости	Предпосевная обработка семян за- 3- 12 дней до посева или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)
1-1,5 л/га		Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	(1-2)
2-3 л/га	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и/или при первых признаках заболевания. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	(1-2)
1 л/т	Подсолнечник	Серая гниль, се- менная инфекция; белая гниль, при- корневая форма, альтернариоз плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосред- ственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Баксис, Ж (титр не менее 10⁹ КОЕ/мл *Bacillus subtilis*, штамм 63-Z)
от 22 мая 2017 г. № 1502

1	2	3	4	5
1 л/т	Соя	Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян- заблаговременно или непосред- ственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)
1 л/т	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозные корневые стеблевые гнили, фузариоз и плесневение семян початков	Протравливание семян- заблаговременно или непосред- ственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	(1)
2 л/га	Ряпс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период- вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	(1-2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ (при опрыскивании) – 1 день.

Запрещается применение препарата:
авиационным методом;
в личных подсобных хозяйствах;
в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

